


Pediatrická ambulance



Jak postupovat při teplotě:

Teplota do 38,0 st. C, v zadečku do 38,5 st. C:

1. Koupel ve vodě 37,0 st. teplé každou hodinu
2. Ledové obklady (zmražené gelové destičky zabalené do pleny) přikládat na čelo, na temeno hlavy a do třísel – zchlazuje se krev, která dále teče krevním oběhem
3. Ledové tekutiny po lžičkách

Teplota nad 38,0st.C, v zadečku nad 38,5st.C:

1. Chlazení – viz. výše
2. Paracetamol - tj. Panadol, Paralen, Ben-u-ron - až 4xdenně po 6 hodinách dle hmotnosti dítěte
 - Lze podat od 2. měsíce věku
 - Panadol sirup, čípky 125, 250 mg
 - Paralen sirup, čípky 100 mg, tbl 125,500 mg
 - Ben-u-rom čípky 250 mg
3. Ibuprofen – tj. Nurofen, Bruffen, Ibalgin dle hmotnosti až 4xdenně po 6 hodinách
 - Lze podat od 3.měsíce věku
 - Nurofen čípky 60mg, 125 mg
 - Nurofen sirup
 - Brufen sirup
 - Ibalgin sirup (od 6. měsíce), tbl 200, 400 mg
4. Pokud teplota vystoupí nad 38,0 (38,5stC v zadečku) dříve než za 6 hodin, můžete podávat, krom chlazení, Paracetamol a Ibuprofen střídavě po 3-4 hodinách.
5. Pokud se Vám nedaří těmito způsoby teplotu srazit a stav se zhoršuje, nebo pokud teplota klesá, pacient není zchvácen, ale trvá déle než 3-4 dny(virové infekce) je nutné vyhledat lékařské ošetření.

